

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ**

**Регистрационный номер:** PN001284/01

**Торговое название:** Натрия нуклеинат

**Международное непатентованное название (МНН) или группировочное название:** натрия нуклеинат

**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой

**Состав**

1 таблетка содержит:

*Действующее вещество:* натрия нуклеинат (в пересчете на сухое вещество) - 250,0 мг.

*Вспомогательные вещества:* повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (12600±2700), поливинилпирролидон К-17), кальция стеарат, крахмал картофельный; состав оболочки: гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза), титана диоксид (двуокись титана), полисорбат-80 (твин-80), парафин жидкий (масло вазелиновое).

**Описание:** круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** лейкопоеза стимулятор.

**Код АТХ:** L03AX

**Фармакологическое действие**

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоз.

**Показания к применению**

Применяют у взрослых в комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний: хронические неспецифические заболевания легких, хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции, вторичные иммунодефицитные состояния, связанные со старением, коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды. Суточная доза - 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения – 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания – до 6 недель).

Пациентам пожилого и старческого возраста с пониженным иммунным статусом – по 1-1,5 г/сут в течение 2-3 недель 2 раза в год (весной и осенью).

При лейкопении взрослым – по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, курс лечения определяется индивидуально, в среднем составляет 10 дней.

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно два – три раза в течение года.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не выявлено.

**Форма выпуска**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.

По 10, 20 или 50 таблеток в банки полимерные типа БП.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги

алюминиевой.

Каждую банку или 1, 2, 5 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Производитель**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

**Юридический адрес и адрес для принятия претензий**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4,  
телефон/факс (8412) 57-72-49.

10800-0037-04