

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НИСТАТИН

Регистрационный номер: P N000840/02

Торговое название: Нистатин

Международное непатентованное название: нистатин

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

Действующее вещество:

Нистатин	55,500 мг (250 000 ЕД)	111,000 мг (500 000 ЕД)
----------	------------------------	-------------------------

Вспомогательные вещества:

Пропилпарагидроксибензоат	2,000 мг	2,000 мг
---------------------------	----------	----------

(нипазол)

Лимонной кислоты моногидрат	0,075 мг	0,075 мг
-----------------------------	----------	----------

Жир твердый	2342,425 мг	2286,925 мг
-------------	-------------	-------------

Примечание. Количество нистатина указано для препарата с активностью 4500 ЕД/мг в пересчете на сухое вещество. В случае применения нистатина более высокой активности количество его соответственно уменьшают, увеличивая количество основы.

Описание: суппозитории желтого цвета, торпедообразной формы, с максимальным диаметром 1,5 см.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ: G01AA01

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик, высокоактивный в отношении дрожжеподобных

грибов рода *Candida*. В структуре антибиотика имеются двойные связи, обладающие высокой тропностью к стероловым структурам клеточной мембраны грибов, что способствует встраиванию молекулы препарата в мембрану клетки и образованию большого количества каналов, через которые осуществляется бесконтрольный транспорт электролитов; повышение осмолярности внутри клетки приводит к ее гибели. Резистентность развивается очень медленно.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается через слизистые оболочки.

Показания к применению

Лечение и профилактика (при длительной местной противомикробной терапии) кандидоза слизистой оболочки влагалища.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, детский возраст до 18 лет (отсутствуют данные об эффективности и безопасности применения нистатина в лекарственной форме для интравагинального применения у детей).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат при беременности противопоказан. Применение в период грудного вскармливания возможно, так как препарат практически не всасывается через слизистые оболочки, поэтому в грудное молоко не проникает.

Способ применения и дозы

Вагинально. Суппозиторий, предварительно освобожденный от контурной ячейковой упаковки при помощи ножниц (разрезав упаковку по контуру суппозитория), вводят во влагалище (после гигиенических процедур) по 1 суппозиторию 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения 10 – 14 дней.

Побочное действие

Возможны местные реакции повышенной чувствительности.

Возможен риск распространения резистентных форм грибов, что требует отмены препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При одновременном применении нистатина с клотримазолом активность последнего снижается.

Особые указания

Во время менструации лечение прерывать не следует.

При грибковых заболеваниях влагалища рекомендуется одновременное лечение полового партнера. В период лечения рекомендуется избегать половых контактов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения препаратом возможно управление автотранспортом и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные 250 000 ЕД и 500 000 ЕД.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещены в картонную пачку.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.