

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Диклофенак

Регистрационный номер Р N003074/02

Торговое название препарата: ДИКЛОФЕНАК

Международное непатентованное или группировочное наименование: диклофенак

Химическое название: натриевая соль 2-((2,6-дихлорфенил) амино) фенилуксусной кислоты

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Описание

Однородная мазь белого или белого с желтоватым или коричневатым оттенком цвета, со слабым специфическим запахом.

Состав на 100 г мази:

Действующее вещество: диклофенак натрия - 1 г;

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид (димексид), макрогол-1500 (полиэтиленоксид 1500), макрогол-400 (полиэтиленоксид 400), пропиленгликоль

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Код АТС: M02AA15

Фармакологические свойства

Диклофенак оказывает противовоспалительное, анальгетическое и противоотечное действие, обусловленное угнетением синтеза простагландинов, которые играют основную роль в патогенезе воспаления.

При ревматических заболеваниях уменьшает боли в суставах в покое и при движении, а также утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений.

При наружном применении диклофенак проникает через кожу и накапливается в подлежащих тканях (подкожной клетчатке, мышечной ткани, суставной капсуле и полости сустава).

Показания к применению

Боли в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника (радикулит, остеоартроз, люмбаго, ишиас); боли в суставах (суставы пальцев рук, коленные и др.) при остеоартрозе; боли в мышцах (вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов, травм); воспаление и отечность мягких тканей и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (тендовагинит, бурсит, поражения периартикулярных тканей, лучезапястный синдром).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам лекарственной формы, ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным средствам, беременность и период лактации, детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы

Мазь Диклофенак наносят в количестве 2-4 грамм (полоска 4-8 см), в зависимости от площади болезненного участка, тонким слоем на пораженное место и осторожно втирают в кожу 3-4 раза в сутки. Мазь следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны.

Побочное действие

В редких случаях могут возникнуть зуд, покраснение, сыпь, жжение местного характера.

Передозировка

При наружном применении мази передозировка маловероятна. Однако при нанесении мази на обширные участки кожи и при длительном применении нельзя полностью исключить возможность проявления системных побочных действий диклофенака.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При применении мази Диклофенак взаимодействие с другими лекарственными средствами минимально. Однако следует помнить, что при одновременном применении диклофенака с калийсберегающими диуретиками возможно повышение концентрации калия в крови, с «петлевыми диуретиками» - уменьшение их диуретического эффекта; с другими НПВП -

повышение риска развития побочных эффектов. Диклофенак при одновременном применении может вызвать повышение концентрации дигоксина и лития в плазме крови.

Форма выпуска

Мазь 1% в тубах алюминиевых по 30 г. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 8 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.