

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**СТРЕПТОЦИД**

**Регистрационный номер ЛСР-004401/10**

**Торговое наименование:** Стрептоцид

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** сульфаниламид

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения

**Состав.**

*Действующее вещество:*

Сульфаниламид (Стрептоцид) - 10,00 г

*Вспомогательное вещество:*

вазелин - 90,00 г

**Описание:** мазь белого или светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство, сульфаниламид

**Код АТХ:** D06BA05

**Фармакологические свойства**

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Показания к применению**

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I и II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кроветворной системы, угнетение костномозгового кроветворения, анемия, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, почечно-печеночная недостаточность, азотемия, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Мазь наносят непосредственно на пораженную поверхность или на марлевую салфетку; перевязки производят через 1 – 2 дня. Курс лечения 10 – 14 дней.

Если в течение 10-14 дней не наступает улучшения или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

**Побочное действие**

Аллергические реакции; при длительном применении больших доз – системное действие: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, кристаллурия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке – тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.

*Лечение:* обильное питье, при случайном приеме внутрь – промывание желудка, симптоматическая терапия.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата. Если вы принимаете другие лекарственные препараты, в том числе безрецептурные, перед применением препарата Стрептоцид следует проконсультироваться с врачом.

#### **Особые указания**

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье.

При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь.

При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат и назначить соответствующее лечение.

Преждевременное прекращение лечения препаратом может способствовать развитию устойчивых к сульфаниламидам штаммов микроорганизмов.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводились. Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

#### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 10 %.

По 25 г в тубе алюминиевой.

Одна туба с инструкцией по применению помещена в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4.

#### **Владелец регистрационного удостоверения/организации, принимающая претензии потребителя**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс: (8412) 57-72-49.

14500-0016-07