МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

# МЕТИЛУРАЦИЛ

**Регистрационный номер:** Р N000757/02

**Торговое наименование:** Метилурацил

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** диоксометилтетрагидропиримидин

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные

**Состав на один суппозиторий**

*Действующее вещество:* диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 500 мг.

*Вспомогательное вещество:* жир твердый.

**Описание**

Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** репарации тканей стимулятор

**Код АТХ:** L03AX

**Фармакологические свойства**

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в т.ч. в быстропролиферирующих клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

**Показания к применению**

Проктит, сигмоидит, язвенный колит.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к диоксометилтетрагидропиримидину, вспомогательному веществу. Острые и хронические лейкемические формы лейкоза (особенно миелоидные), лимфогранулематоз, злокачественные заболевания костного мозга, детский возраст до 8 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Специальных исследований, касающихся безопасности применения препаратов, содержащих в качестве действующего вещества диоксометилтетрагидропиримидин в лекарственной форме суппозитории ректальные у беременных и в период грудного вскармливания, не проводилось. Препарат применяют при беременности и в период грудного вскармливания только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

**Способ применения и дозы**

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника.

Взрослым - по 1-2 суппозитория 3-4 раза в сутки, детям в возрасте 8-18 лет - по 1 суппозиторию в сутки.

Перед применением препарата следует тщательно вымыть руки. Суппозиторий вынимают из контурной ячейковой упаковки и вводят в прямую кишку. Для достижения максимального терапевтического эффекта суппозиторий следует вводить как можно глубже.

Длительность курса лечения от 7 дней до 4 месяцев в зависимости от характера заболевания. Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Повторные курсы лечения проводят по рекомендации врача.

**Побочное действие**

*Нарушения со стороны иммунной системы:* аллергические реакции;

*Нарушения со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение;

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* кратковременное ощущение жжения в области прямой кишки.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Не изучалось.

**Особые указания**

Нет сведений.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения, учитывая возможность развития побочного действия - головокружения.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 500 мг.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или ПВХ/ПЭ.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

ПАО «Биосинтез», Россия, 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, 4, телефон/факс (8412) 57-72-49.